

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

de Septiembre

Tamaño: Pequeño.

Forma: Esfero-cónica y con frecuencia marcadamente aplastada en la parte inferior. Contorno pentagonal.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda, de fondo ruginoso o limpio. Bordes globosos y aplastados. **Pedúnculo:** Fino, mas bien corto, un poco curvado, leñoso, rojizo y levemente lanoso.

Cavidad del ojo: Relativamente ancha, poco profunda, fruncida y de bordes irregularmente ondulados. **Ojo:** Pequeño o medio, cerrado o entreabierto. Sépalos compactos en su base, irregularmente convergentes, a veces sólo hasta por encima de su mitad en que lo hacen hacia fuera.

Piel: Lisa, recubierta de pruina violácea. **Color:** Fondo amarillo con suave chapa cobriza o roja. Sobre el fondo le caracteriza un intenso barreado de rojo vivo en forma irradiada desde la cavidad peduncular. Punteado abundante, uniformemente repartido y visible.

Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, con los estambres situados por su mitad, en algunos frutos se pierden quedando sólo el pistilo que es muy consistente.

Corazón: Medio y pequeño, situado más cerca del pedúnculo, bulbiforme o estrecho y alargado. Celdas alargadas que en algunos frutos se desplazan desde la mitad de la parte superior. El punto entre la inserción del pedúnculo y celdillas está teñido de un rojo intenso.

Semillas: Poco abundantes, generalmente no se encuentran más de tres y éstas pequeñas, casi esféricas.

Carne: Color crema. Crujiente. **Sabor:** Acidulado.

Maduración: Otoño.

